

آموزش صین بستری سدرم دیترس تنفسی کودکان

کد پمفلت : IQF-158-

Day 2

❖ تغذیه و تغذیه

- ✓ در صورت مشکل بلع یا تهوع و استفراغ و یا دیترس تنفسی شدید، موقتاً تغذیه از راه دهان قطع و تا بهبودی علائم مایعات وریدی جایگزین آن می‌شود.
- ✓ پس از شروع رژیم توسط پزشک به کودک اجازه دهید که رژیم غذایی در حد تحمل و مورد علاقه خود را داشته باشد .
- ✓ پس از شروع رژیم به کودک مایعات فراوان دهید تا ترشحات رقیق شود.

❖ فعالیت

- ✓ تا هنگام فروکش کردن تب، استراحت در بستر ضروری است. پس از آن می‌تواند فعالیت‌های طبیعی را به تدریج از سر بگیرد.
- ✓ انجام فعالیت‌ها متناسب با سطح تحمل و سن کودک باشد به طوری که با استراحت کودک تداخل ننماید .

❖ مراقبت

- ✓ بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل کشت خلط، آزمایش‌های خون و عکس ساده قفسه سینه باشد .
- ✓ در صورت تجویز اکسیژن از کم و زیاد کردن حجم آن خودداری شود .
- ✓ برای اینکه کودک یک پوزیشن راحت تر داشته باشد سرتخت را بالا ببرید. انجام فیزیوتراپی قفسه سینه در حد تحمل برای کودک انجام می‌شود .
- ✓ تغییر پوزیشن دوره ای کودک برای بهبود ترشح برونش و بهبود اتساع و تهویه تمام نواحی ریه باید انجام شود، از یکطرف به طرف دیگر و از جلو به عقب.
- ✓ کودک را تشویق به تخلیه خلط کنید.
- ✓ جهت تخفیف درد سینه میتوان از یک بالش تک ساده یا کمپرس گرم بر روی قفسه سینه استفاده کنید.
- ✓ محیطی آرام برای کودک فراهم آورید .
- ✓ رعایت بهداشت فردی مانند شست و شوی مرتب دست و صورت و اجتناب از تماس با افراد مبتلا به عفونت‌های تنفسی، بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری تنفسی است.

❖ داروها

- ✓ اکسیژن درمانی، طبق دستور پزشک توسط پرستار تجویز می‌شود. از قطع خودسرانه آن اجتناب نمائید.
- ✓ داروهای آنتی بیوتیک (جهت از بین بردن عفونت‌ها)، گشاد کننده ریه‌ها (جهت برطرف شدن تنگی نفس)، کورتیکواستروئیدها (از بین بردن التهاب) و سرم (از بین بردن کم آبی و تزریق داروها) طبق دستور پزشک در فواصل و زمان‌های تعیین شده توسط پرستار به کودک داده می‌شود و از شما انتظار می‌رود با آن‌ها همکاری کنید.

منابع: پرستاری کودکان وونگ. ۲۰۱۹ – پرستاری کودکان، کودک بیمار، حامد مرتضوی بهار ۱۴۰۳ واحد آموزش به بیمار

آموزش صین ترخیص ندرم دیسترس تنفسی کودکان کد پمفلت: IQF-158-

❖ رژیم غذایی و تغذیه

- ✓ تغذیه مناسب بخصوص در کودکان عامل مهمی در پیشگیری از عفونتهای ریه است. بهتر است از غذاهایی مانند سوپ، آش، فرنی و... که احتیاج به جویدن ندارند، استفاده کنید.
- ✓ در طول درمان و تا حصول بهبودی کامل از دادن مواد غذایی همچون موز، شیرینی و شکلات، آجیل ودانه های روغنی که باعث تحریک سرفه و افزایش درد قفسه سینه می شوند، خودداری کنید.
- ✓ از مصرف غذاهای سرخ کرده، پر ادویه ومحرک برای کودک خودداری کنید.
- ✓ به کودک اجازه دهید رژیم غذایی در حد تحمل و مورد علاقه خود را داشته باشد و مایعات کافی مصرف نماید.

❖ فعالیت

- ✓ بهتر است از فعالیت های بیشتر از توان کودک جلوگیری شود
- ✓ با نظر پزشک برنامه ی فعالیت بدنی کودک را تنظیم کنید.

❖ مراقبت

- ✓ با توصیه ی پزشک تمرینات کمک تنفسی (بازتوانی تنفسی) کودک را دنبال کنید
- ✓ هنگام استراحت کودک را در وضعیت نیمه نشسته قرار دهید تا در تنفس راحت تر باشد.
- ✓ با استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا با بخار و بخور گرم رطوبت کافی را برای تنفس راحت تر کودک را فراهم کنید.
- ✓ به طور مکرر در تخت وضعیت کودک را تغییر دهید.
- ✓ رعایت بهداشت فردی مانند شست وشوی مرتب دست و صورت و اجتناب از تماس با افراد مبتلا به عفونت های تنفسی، بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری تنفسی است.
- ✓ محیط استراحت کودک را تمیز کنید.
- ✓ از فعالیت هایی که باعث تشدید علائم (تنگی نفس و...) کودک می شود، جلوگیری کنید.
- ✓ به بهداشت فردی کودک (شستن دست، مسواک زدن و...) را جهت جلوگیری از عفونت های ناشی از عملکرد ضعیف سیستم ایمنی توجه کنید.

❖ دارو

- ✓ داروهای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستور مصرف کنید

❖ زمان مناسب مراجعه به پزشک یا بیمارستان

- ✓ سرفه های شدید و مشکل در تنفس و سیاه شدن لب ها
- ✓ تب طولانی مدت
- ✓ مشکل در تغذیه و کم آبی کودک

منابع: پرستاری کودکان وونگ. ۲۰۱۹ – پرستاری کودکان، کودک بیمار، حامد مرتضوی – بهار ۱۴۰۳ واحد آموزش به بیمار