



## موضوع آموزش:

### آپاندیسیت

#### آشنایی با بیماری آپاندیسیت:

آپاندیس یک زائد کوچک انگشت مانند با طولی در حدود ۱۰ سانتی متر می‌باشد که در درون شکم انسان قرار دارد. این زائد بطور پیوسته از غذاپر و تخلیه می‌شود. از آنجا که این زائد بطور کامل تخلیه نمی‌شود و قطر آن کوچک می‌باشد لذا مستعد عفونت و انسداد است.

### آموزش به بیمار مبتلا به آپاندیسیت



آذرماه ۱۳۹۰

#### تظاهرات بالینی:

کاهش اشتها ، تهوع ، استفراغ ، نفخ شکم، نکته مهم: وقتی بیمار دچار تب، تهوع یا درد شکم می‌شود نباید ملین(کارکن) یا مسکن بخورد.

- تشخیص بیماری - انجام معاینه بالینی توسط پزشک- انجام آزمایش خون و ادرار- انجام رادیوگرافی و سونوگرافی شکم

#### درمان:

درمان بیماری غالباً جراحی است که آپاندیس به وسیله جراح برداشته می‌شود.

برداشتن این زائد ملتهب هیچگونه مشکلی را برای شما ایجاد نمیکند ولی مانند آن در شکم سیار خطرناک بوده و عموماً توسط جراح برداشته می‌شود.

پس از عمل و به هوش آمدن به شما داروهای مسکن و آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک معالجه داده خواهد شد. یکی از عوامل موثر در تسريع پهلوی شما بعد از عمل راه رفتن می‌باشد که باید مرتبآرا انجام دهید.

#### توصیه های لازم در زمان ترخیص:

- پانسمان ناحیه عمل قبل از ترخیص از بیمارستان تعویض شده و ناحیه عمل توسط پزشک و پرستار کنترل شود. حتماً بر طبق تاریخ کارت مراجعة خود به مطب به پزشک مراجعة نمایید.

- در منزل تا ۴۸ ساعت چمام نرفته سپس پانسمان ناحیه عمل را طبق نظر پزشک معالج برداشته و به حمام بروید. این پس ناحیه عمل نیاز به پانسمان ندارد مگر اینکه پزشک معالج شما دستور داده باشد.

- به مدت دو هفته از انجام کارهای سنگین خودداری ننماید. پس از این مدت میتوانید به فعالیتهای طبیعی و روزمره خود ادامه دهید. البته در مواردی که شکم نوع دیگری باز شده باشد و یا مواردی که خزم باز باشد زمان شروع فعالیت کمی به تعویق خوده افتاده ولی کلا محدودیت حرکت بیمار در این جراحی زیاد نیست و بیمار می‌تواند با شکم بند کشی به کار روزانه خود باز گردد و پس از مدتی نیز به شکم بند احتیاج نخواهد بود

- در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل عمل جراحی مانند قرمزی، تورم و التهاب فوراً به پزشک معالج خود مراجعة نمایید.

- داروهای تجویز شده توسط پزشک را در منزل طبق ساعتهای دستور داده شده بطور دقیق مصرف نمایید.

- رژیم غذایی شما پس از ترخیص معمولی می‌باشد ولی باید تا حد امکان از مواد پروتئینی مانند شیر، ماست، گوشت و میوه جاتی که حاوی ویتامین ث بیشتری می‌باشد استفاده کرده و از خوردن غذاهای ناخ برهیز نمایید.

بعد از جراحی آپاندیسیت، فرد ممکن است دچار احتیاط ادراری شود که با کیسه آب گرم و یا سوندراز موقت بیمار مشکل حل می‌شود. آپاندیسیت زمانی که جراحی می‌شود عود نخواهد داشت و فرد باید بداند که در صورت بروز درد های همراه و یا جدید بعد از جراحی آپاندیس، تشخیص دیگری را برای بیمار مطرح می‌سازد.